カオスと分岐

非線形システム特論 2004

池口 徹

埼玉大学 大学院 理工学研究科 情報数理科学専攻

338-8570 さいたま市 桜区 下大久保 255

Tel : 048-858-3577, Fax : 048-858-3716

Email : tohru@ics.saitama-u.ac.jp

URL : <http://www.nls.ics.saitama-u.ac.jp/~tohru>

分岐 (bifurcation) とは

◀ (離散時間) 力学系

$$x(t + 1) = f_{\mu}(x(t))$$

におけるパラメータ μ の値を変化させて解を求める

パラメータ値に応じて, 様々な解のタイプ
= 力学系の解の構造が変化 = 分岐

◀ 例: カオスでない状態 → カオス (カオスへ至るルート)

固定点 (不動点) ⇒ 周期解 ⇒ … ⇒ カオス

分岐の例

ロジスティック写像の分岐図 (bifurcation diagram)

ロジスティック写像と分岐

ロジスティック写像

$$x(t + 1) = ax(t)(1 - x(t)) \triangleq f_a(x(t))$$

を対象にして,

- ◀ 不動点
- ◀ m - 周期点
- ◀ 初期値 $x(0)$ に関する軌道
- ◀ 不動点の安定性

を考えよう.

不動点と周期点

◀ 不動点, 固定点 (fixed point)

$$\bar{x} \quad \text{s.t.} \quad f_a(\bar{x}) = \bar{x}$$

◀ m - 周期点 (m は自然数)

$$f_a^m(x) = x$$

$$f_a^n(x) \neq x \quad (n = 1, 2, 3, \dots, m - 1)$$

◀ (注意) 例)

$$f_a^n(x) \neq \{f_a(x)\}^n$$

$$f_a(x) = ax(1 - x)$$

$$f_a^2(x) = f_a(f_a(x)) = a \{ax(1 - x)\} (1 - \{ax(1 - x)\})$$

$$= \dots \neq a^2 x^2 (1 - x)^2 = \{f_a(x)\}^2$$

軌道と図式解法

◀ 初期値 $x(0)$ に関する軌道

$$\{x(t), t = 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

軌道と図式解法

◀ 初期値 $x(0)$ に関する軌道

$$\{x(t), t = 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

軌道と図式解法

◀ 初期値 $x(0)$ に関する軌道

$$\{x(t), t = 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

軌道と図式解法

◀ 初期値 $x(0)$ に関する軌道

$$\{x(t), t = 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

軌道と図式解法

◀ 初期値 $x(0)$ に関する軌道

$$\{x(t), t = 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

軌道と図式解法

◀ 初期値 $x(0)$ に関する軌道

$$\{x(t), t = 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

軌道と図式解法

◀ 初期値 $x(0)$ に関する軌道

$$\{x(t), t = 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

軌道と図式解法

◀ 初期値 $x(0)$ に関する軌道

$$\{x(t), t = 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

軌道と図式解法

◀ 初期値 $x(0)$ に関する軌道

$$\{x(t), t = 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

軌道と図式解法

◀ 初期値 $x(0)$ に関する軌道

$$\{x(t), t = 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

ロジスティック写像と図式解法

$$a = 2.4$$

$$a = 3.2$$

$$a = 3.5$$

$$a = 3.7$$

$$a = 3.84$$

$$a = 4.0$$

不動点の安定性

◀ 安定な不動点

$$\bar{x} = f_a(\bar{x})$$

$$|f'_a(\bar{x})| < 1$$

$$\begin{aligned}\bar{x} + \epsilon(t+1) &= f_a(\bar{x} + \epsilon(t)) \\ &\approx f_a(\bar{x}) + f'_a(\bar{x})\epsilon(t) \\ &= \bar{x} + f'_a(\bar{x})\epsilon(t) \\ \therefore \epsilon(t+1) &= f'_a(\bar{x})\epsilon(t)\end{aligned}$$

不動点の安定性

[定理]

力学系 $f(x)$ が微分可能で、 $f'(x)$ は連続であるとする。 $\bar{x}$ を力学系 $f(x)$ の不動点とする。 $|f'(\bar{x})| < 1$ であるとき、 $\bar{x}$ の近傍 V が存在して、

$$\bar{x} \in V \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f^n(\bar{x}) = \bar{x}$$

不動点の安定性

今, $|f'_a(\bar{x})| < 1$ であるから

$$0 < \exists \lambda < 1, \exists \delta < 0 \quad \text{s.t.} \quad \text{for } \forall x \text{ in } I \in [\bar{x} - \delta, \bar{x} + \delta]$$

$$|f'_a(\bar{x})| < \lambda < 1$$

とすることができる。従って, 平均値の定理より,

$$\text{for } \forall p \in I, \exists c \in I$$
$$\frac{|f_a(p) - f_a(\bar{x})|}{|p - \bar{x}|} = f'_a(c) < \lambda < 1$$

$$\Leftrightarrow |f_a(p) - f_a(\bar{x})| < \lambda |p - \bar{x}| < |p - \bar{x}|$$

とすることができる。

不動点の安定性

次に, $f_a(p) \in I$ なので $f_a(p)$ と $f_a(\bar{x})$ に同じことを適用すると,

$$|f_a^2(p) - f_a^2(\bar{x})| = |f_a(f_a(p)) - f_a(f_a(\bar{x}))| < \lambda |f_a(p) - f_a(\bar{x})|$$

つまり

$$|f_a^2(p) - \bar{x}| < \lambda^2 |p - \bar{x}|$$

これを n 回繰り返すと

$$|f_a^n(p) - \bar{x}| < \lambda^n |p - \bar{x}|$$

$0 < \lambda < 1$ であるから $\lambda^n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$

$$\therefore f_a^n(p) \rightarrow \bar{x} (n \rightarrow \infty)$$

不動点の安定性 (補足)

- ◀ 状態空間の中で $\bar{x}$ に収束する p の集合をベイソン (basin) , 引き込み領域
- ◀ この定理は, 不動点の近傍のみにおいて成立. 大域的には何も言えない.
- ◀ 但し, ロジスティック写像の場合は, 不動点がこの意味で安定であれば, $I \in [0, 1]$ に対して大域的吸引不動点.
- ◀ 不安定な不動点

$$\bar{x} = f_a(\bar{x}), \quad |f'_a(\bar{x})| > 1$$

- ◀ n 周期点については, $f_a \rightarrow f_a^n$ とする.

$$\bar{x} = f_a^n(\bar{x}), \quad |(f_a^n)'(\bar{x})| < 1$$

ロジスティック写像の場合

$$x(t + 1) = f_a(x(t)) = ax(t)(1 - x(t))$$

◀ 不動点 u は?

ロジスティック写像の場合

$$x(t + 1) = f_a(x(t)) = ax(t)(1 - x(t))$$

◀ 不動点 u は?

$$u = f_a(u) = au(1 - u) \iff u = 0, u = 1 - \frac{1}{a}$$

ロジスティック写像の場合

$$x(t + 1) = f_a(x(t)) = ax(t)(1 - x(t))$$

◀ 不動点 u は?

$$u = f_a(u) = au(1 - u) \iff u = 0, u = 1 - \frac{1}{a}$$

◀ 不動点 u の安定性

ロジスティック写像の場合

$$x(t + 1) = f_a(x(t)) = ax(t)(1 - x(t))$$

◀ 不動点 u は?

$$u = f_a(u) = au(1 - u) \iff u = 0, u = 1 - \frac{1}{a}$$

◀ 不動点 u の安定性 $f'_a(u) = a - 2au = a(1 - 2u)$

ロジスティック写像の場合

$$x(t + 1) = f_a(x(t)) = ax(t)(1 - x(t))$$

◀ 不動点 u は?

$$u = f_a(u) = au(1 - u) \iff u = 0, u = 1 - \frac{1}{a}$$

◀ 不動点 u の安定性 $f'_a(u) = a - 2au = a(1 - 2u)$

1. $u = 0$

2. $u = 1 - \frac{1}{a}$

ロジスティック写像の場合

$$x(t+1) = f_a(x(t)) = ax(t)(1-x(t))$$

◀ 不動点 u は?

$$u = f_a(u) = au(1-u) \iff u = 0, u = 1 - \frac{1}{a}$$

◀ 不動点 u の安定性 $f'_a(u) = a - 2au = a(1 - 2u)$

1. $u = 0 \Rightarrow f'_a(0) = a$

2. $u = 1 - \frac{1}{a}$

ロジスティック写像の場合

$$x(t+1) = f_a(x(t)) = ax(t)(1-x(t))$$

◀ 不動点 u は?

$$u = f_a(u) = au(1-u) \iff u = 0, u = 1 - \frac{1}{a}$$

◀ 不動点 u の安定性 $f'_a(u) = a - 2au = a(1 - 2u)$

1. $u = 0 \Rightarrow f'_a(0) = a$

$0 \leq a < 1$ $0 \leq f'_a(0) < 1$ **安定**

$1 < a$ $f'_a(0) > 1$ **不安定**

2. $u = 1 - \frac{1}{a}$

ロジスティック写像の場合

$$x(t+1) = f_a(x(t)) = ax(t)(1-x(t))$$

◀ 不動点 u は?

$$u = f_a(u) = au(1-u) \iff u = 0, u = 1 - \frac{1}{a}$$

◀ 不動点 u の安定性 $f'_a(u) = a - 2au = a(1 - 2u)$

1. $u = 0 \Rightarrow f'_a(0) = a$

$0 \leq a < 1 \quad 0 \leq f'_a(0) < 1 \quad \text{安定}$

$1 < a \quad f'_a(0) > 1 \quad \text{不安定}$

2. $u = 1 - \frac{1}{a}$

まず、解の存在を考える必要がある。

ロジスティック写像の場合

$$2. \quad u = 1 - \frac{1}{a}$$

$0 \leq a < 1$ $u < 0$ $0 < u < 1$ を考えるのでなし

$a < 1$ $u > 0$ **存在する**

ロジスティック写像の場合

$$2. \quad u = 1 - \frac{1}{a}$$

$0 \leq a < 1$ $u < 0$ $0 < u < 1$ を考えるのでなし

$a < 1$ $u > 0$ 存在する

このとき,

$$f'_a \left(1 - \frac{1}{a} \right) = a - 2a \left(1 - \frac{1}{a} \right) = 2 - a$$

より,

ロジスティック写像の場合

$$2. \quad u = 1 - \frac{1}{a}$$

$0 \leq a < 1$ $u < 0$ $0 < u < 1$ を考えるのでなし
 $a < 1$ $u > 0$ 存在する

このとき,

$$f'_a \left(1 - \frac{1}{a} \right) = a - 2a \left(1 - \frac{1}{a} \right) = 2 - a$$

より,

$0 \leq a < 1$ $|f'_a \left(1 - \frac{1}{a} \right)| > 1$ $u = 1 - \frac{1}{a}$ は不安定
 $1 \leq a < 3$ $|f'_a \left(1 - \frac{1}{a} \right)| < 1$ $u = 1 - \frac{1}{a}$ は安定
 $3 < a \leq 4$ $|f'_a \left(1 - \frac{1}{a} \right)| > 1$ $u = 1 - \frac{1}{a}$ は不安定

トランスクリティカル分岐

$u = 0, u = 1 - \frac{1}{a}$, 実線:安定, 破線:不安定

トランスクリティカル分岐

$u = 0, u = 1 - \frac{1}{a}$, 実線:安定, 破線:不安定

2つの不動点の間で, 安定性が入れ替わる

ロジスティック写像の分岐図

ロジスティック写像の分岐図

ロジスティック写像の分岐図

周期倍分岐

$a = 3$ 以降では何が起きているか?

◀ $u = 1 - \frac{1}{a} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ であるから,

$$f'_a(u) = a - 2au = 3 - 2 \cdot 3 \cdot \frac{2}{3} = -1$$

つまり, $a > 3$ では $f'_a(u) < -1$ となり不安定化

◀ 分岐図をみると, $a > 3$ では2周期解が現れている

$f_a(x)$ と $f_a^2(x)$ のグラフを描いてみよう

確認！

$f_a(x) = ax(1 - x)$ とする . このとき $f_a^2(x)$ は？

確認！

$f_a(x) = ax(1 - x)$ とする . このとき $f_a^2(x)$ は?

$$\begin{aligned} f_a^2(x) &= \{ax(1 - x)\}^2 \\ &= a^2 x^2 (1 - x)^2 \end{aligned}$$

確認！

$f_a(x) = ax(1 - x)$ とする . このとき $f_a^2(x)$ は?

$$\begin{aligned} f_a^2(x) &= \{ax(1 - x)\}^2 \\ &= a^2 x^2 (1 - x)^2 \end{aligned}$$

ダメダメ

確認！

$f_a(x) = ax(1 - x)$ とする . このとき $f_a^2(x)$ は?

$$\begin{aligned} f_a^2(x) &= \{ax(1 - x)\}^2 \\ &= a^2 x^2 (1 - x)^2 \end{aligned}$$

ダメダメ

$$\begin{aligned} f_a^2(x) &= f_a(f_a(x)) \\ &= a \{ax(1 - x)\} \{1 - ax(1 - x)\} \end{aligned}$$

ロジスティック写像 $a = 3$ 付近

$$a = 2.8$$

$$a = 3.0$$

$$a = 3.3$$

- ◀ $a = 2.8 < 3$ では不動点 $u = 1 - \frac{1}{a} \approx 0.6429 \dots$ が安定
- ◀ $a = 3$ では f^2 が $u = 2/3$ において接している
- ◀ $a = 3.3 > 3$ では f^2 と 45 度の直線が 4 箇所 (不動点 u と 2 周期解 q_1, q_2) で交わっている。

周期倍分岐

◀ まず，不動点 u に対して，2 回写像 f_a^2 に関する安定性，不安定性を考えてみよう．

$$\begin{aligned}\left(f_a^2\right)'(u) &= f_a'(f_a(u)) \cdot f_a'(u) \\ &= f_a'(u) \cdot f_a'(u) \\ &= \left\{f_a'(u)\right\}^2\end{aligned}$$

□ $1 < a < 3$ では $|f_a'(u)| < 1 \iff \left(f_a^2\right)'(u) < 1$

□ $a = 3$ では $|f_a'(u)| = -1 \iff \left(f_a^2\right)'(u) = 1$

□ $a > 3$ では $|f_a'(u)| > -1 \iff \left(f_a^2\right)'(u) > 1$

◀ $a = 3$ を越えると不動点 u も f_a^2 について不安定

◀ それでは，2 周期点は安定化？不安定？

周期倍分岐

2 周期点 q_1, q_2 を求めるには?

周期倍分岐

2 周期点 q_1, q_2 を求めるには?

$$f_a^2(q) = q$$

$$\iff f_a^2(q) = a \{aq(1 - q)\} \{1 - aq(1 - q)\} = q$$

$$\iff q \left(q - 1 + \frac{1}{a} \right) \{a^2 q^2 - (a^2 + a)q + a + 1\} = 0$$

$$\iff q_i = \frac{a + 1 \pm \sqrt{(a + 1)(a - 3)}}{2a}, \quad (i = 1, 2)$$

周期倍分岐

2 周期点 q_1, q_2 を求めるには?

$$f_a^2(q) = q$$

$$\iff f_a^2(q) = a \{aq(1 - q)\} \{1 - aq(1 - q)\} = q$$

$$\iff q \left(q - 1 + \frac{1}{a} \right) \{a^2 q^2 - (a^2 + a)q + a + 1\} = 0$$

$$\iff q_i = \frac{a + 1 \pm \sqrt{(a + 1)(a - 3)}}{2a}, \quad (i = 1, 2)$$

2 周期点の点の安定性を見るためには, 2 回写像 $f_a^2(q)$ に関する微分係数 $(f_a^2)'(q_1), (f_a^2)'(q_2)$ の値を求め, その絶対値が 1 よりも大きいかが, 小さいかを見れば良い.

周期倍分岐

◀ まず, q_1, q_2 は2周期点なので,

$$f_a(q_1) = q_2, \quad f_a(q_2) = q_1$$

であることに注意すると,

$$\begin{aligned} (f_a^2)'(q_1) &= (f_a(f_a(q_1)))' \\ &= f_a'(f_a(q_1)) \cdot f_a'(q_1) \\ &= f_a'(q_2) \cdot f_a'(q_1) = (f_a^2)'(q_2) \end{aligned}$$

◀ $f_a'(x) = a - 2ax = a(1 - 2x)$ であるから,

$$f_a'(q_1) = a(1 - 2q_1)$$

$$f_a'(q_2) = a(1 - 2q_2)$$

周期倍分岐

◀ 従って,

$$\begin{aligned}(f_a^2)'(q_1) &= (f_a^2)'(q_2) = f_a'(q_2) \cdot f_a'(q_1) \\ &= a^2(1 - 2q_1)(1 - 2q_2) \\ &= a^2 \{1 - 2(q_1 + q_2) + 4q_1q_2\}\end{aligned}$$

◀ ここで q_1, q_2 は以下の方程式の解である

$$a^2q^2 - (a^2 + a)q + a + 1 = 0$$

◀ 解と係数の関係より

$$q_1 + q_2 = \frac{a^2 + a}{a^2}, \quad q_1q_2 = \frac{a + 1}{a^2}$$

周期倍分岐

◀ まとめる

$$\begin{aligned}(f_a^2)'(q_1) &= (f_a^2)'(q_2) = f_a'(q_2) \cdot f_a'(q_1) \\ &= a^2(1 - 2q_1)(1 - 2q_2) \\ &= a^2\{1 - 2(q_1 + q_2) + 4q_1q_2\} \\ &= -a^2 + 2a + 4 = -(a - 1)^2 + 5\end{aligned}$$

□ $(f_a^2)'(q_1) = -1$ より

$$a = 1 + \sqrt{6} = 3.44948974278318\dots$$

(と $a = 1 - \sqrt{6} < 0$)

□ $(f_a^2)'(q_1) = 1$ より $a = 3$ (と $a = -1 < 0$)

2周期解から4周期解へ

◀ $a = 3.67$ 付近で2周期解が消え, 4周期解が現れる.

◀ f^2, f^4 を描くとどうなるか?

2周期解から4周期解

◀ $f \rightarrow f^2$ と類似の関係が, $f^2 \rightarrow f^4$ にもある

2周期解から4周期解

◀ $f \rightarrow f^2$ と類似の関係が, $f^2 \rightarrow f^4$ にもある

◀ 4周期解から8周期解は?

4周期解から8周期解

◀ 再び, $f \rightarrow f^2$, $f^2 \rightarrow f^4$ と類似の関係

4周期解から8周期解

◀ 再び, $f \rightarrow f^2$, $f^2 \rightarrow f^4$ と類似の関係

4周期解から8周期解

◀ 再び, $f \rightarrow f^2$, $f^2 \rightarrow f^4$ と類似の関係

◀ 以降 (8 $\rightarrow$ 16 $\rightarrow$ 32 $\rightarrow$ ...) も同様

$$2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow \dots \rightarrow 2^\infty$$

$$2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow \dots \rightarrow 2^\infty$$

分岐点を $a_n : 2^{n-1} \rightarrow 2^n$ とすると...

ファイゲンバウム定数

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{a_{n+1} - a_n} = 4.669201609103$$

◀ なぜこれが人々を驚かせたか？

ファイゲンバウム定数

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{a_{n+1} - a_n} = 4.669201609103$$

- ◀ なぜこれが人々を驚かせたか?
- ◀ 1次元写像で求められた定数が，実験系においてもかなりの精度で推定されたため

Universality 普遍性

条件

1. unimodal (単峰性) 1次元写像
2. $f''(x) \neq 0$ at peak
3. Schwarz 微分 $S(f) = \frac{f'''}{f'} - \frac{3}{2} \left(\frac{f''}{f'} \right)^2 < 0$

3周期の窓

◀ 一番目立つ (?) 窓 → 周期3

3 周期の窓

◀ なぜ , 周期 3 の窓が出現するのか $\Rightarrow f_a^3$ を考える

$$f_a^3(x) = x \iff x \left(x - 1 + \frac{1}{a} \right) (x \text{ の } 6 \text{ 次式})$$
$$\iff a^2 - 2a - 7 = 0 \iff a = 1 \pm \sqrt{8}$$

$$a = 3.8$$

$$a = 1 + \sqrt{8}$$

$$a = 3.84$$

$a = 1 + \sqrt{8}$ 前後

- ◀ 各接点では a の増加と共に直線を横切る
 $a = 3.82$, $a = 1 + \sqrt{8} = 3.8284\dots$, $a = 3.835$
- ◀ 安定な周期解と不安定な周期解がペアで発生
⇒ 接線分岐 (tangent bifurcation)

$a = 1 + \sqrt{8}$ 前後

- ◀ 各接点では a の増加と共に直線を横切る
 $a = 3.82$, $a = 1 + \sqrt{8} = 3.8284 \dots$, $a = 3.835$
- ◀ 安定な周期解と不安定な周期解がペアで発生
⇒ 接線分岐 (tangent bifurcation)

$a = 1 + \sqrt{8}$ 前後

- ◀ 各接点では a の増加と共に直線を横切る
 $a = 3.82$, $a = 1 + \sqrt{8} = 3.8284 \dots$, $a = 3.835$
- ◀ 安定な周期解と不安定な周期解がペアで発生
⇒ 接線分岐 (tangent bifurcation)

3周期の窓付近

◀ $3 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 24 \rightarrow \dots \rightarrow 3 \cdot 2^n \dots \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$

接線分岐

- ◀ 安定な周期解と不安定な周期解がペアになって生じる
- ◀ 接線分岐 (tangent bifurcation)
  - { 安定な 3 周期点 $\Rightarrow$ 周期倍分岐を経てカオス
  - { 不安定な 3 周期点
- ◀ 接線分岐を逆に辿ると間欠性カオス (intermittency) が発生

参考文献

- ◀ M. J. Feigenbaum : J. Stat. Phys, **19**(1), 25–32, 1978;
21(6), 669–766, 1979
- ◀ 山口昌哉: カオスとフラクタル, ブルーバックス, 講談社 .
- ◀ 早間 慧 (はやま さとし): カオス力学の基礎 第2版, 現代数
学社 .
- ◀ R. L. Devaney: カオス力学系入門 第2版, 共立出版 .
- ◀ 他